

Fenovet®

Reg. SAGARPA.: Q-0029-010

Antibiótico a base de penicilina sintética.



Cada 100 g contienen:
Fenoximetilpenicilina potásica.....10 g
Equivalente a 15 MUI de penicilina V
Vehículo c.b.p..... 100 g



ADMINISTRACIÓN

Oral, mezclado en el alimento.



DOSIFICACIÓN

10 mg/kg por día, por un periodo de 10 a 15 días



INDICACIONES

Para el tratamiento y control de infecciones en cerdos por *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Pasteurella*, erisipela, principalmente frente a infecciones causadas por *Streptococcus suis* (meningitis, artritis) y enfermedad de Glässer (*Haemophilus parasuis*)



ADVERTENCIAS

No administre en caso de hipersensibilidad a los betalactámicos. En casos de sobre-dosificación pueden manifestarse trastornos digestivos que desaparecen al cesar la medicación. No deben manipular el producto personas con hipersensibilidad a las penicilinas. Cuando se prepare el alimento medicado, debe portarse guantes, ropa protectora y mascarilla contra polvos. Mantener el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.

Atención a clientes
+52 (55) 54 81 54 43
contactoah@sanfer.com.mx
www.sanfersaludanimal.com.mx

10VP0724



PRESENTACIÓN

Saco de 25 Kg.



USO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

sanfer®

Fenovet®

Reg. SAGARPA.: Q-0029-010

Premezcla antibiótica, segura y eficaz para el control de agentes patógenos



sanfer®

Fenovet®

Reg. SAGARPA.: Q-0029-010


Premezcla antibiótica, segura y eficaz para el control de agentes patógenos en la industria porcícola

¿QUÉ BENEFICIOS OFRECE LA FENOXIMETILPENICILINA?

Cada 100 g contienen:

Fenoximetilpenicilina potásica.....10 g
equivalente a 15 MUI de penicilina V

Vehículo c.b.p.....100 g



Es una penicilina con doble efecto: bactericida y bacteriostático. Tiene efecto sobre bacterias gram positivas y las principales bacterias gram negativas. La premezcla es estable, resistente al pH ácido y al proceso de peletizado con lo que se evita el "blindaje"

que pudiera afectar su potencia y distribución a los tejidos. Por ser una penicilina se asegura que el producto es inocuo y seguro de emplear en animales adultos y jóvenes, en sus diferentes etapas productivas y/o reproductivas.

Para el tratamiento y control de primera elección de infecciones causadas por *Streptococcus suis*, *Haemophilus parasuis*, *Staphylococcus*, *Pasteurella multocida*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

- Debido al uso continuo de antibióticos del grupo de las penicilinas (amoxicilina, ampicilina, cloxacilina y la bencilpenicilina), en la alimentación de cerdos como tratamiento preventivo y correctivo de enfermedades, se ha creado un elevado índice de resistencia antimicrobiana.

Estas sales están restringidas por vía alimenticia, por la sensibilidad al pH estomacal y su rápida degradación en condiciones ácidas, lo cual limita su efecto de acción y al complementar los programas preventivos.

USOS Y ESQUEMA DE APLICACIÓN DE FENOVET®

CERDAS GESTANTES

- Bajar la presión de infección en el hato reproductor estableciendo un programa de medicación por 2 semanas (2-3kg/Ton) con intervalos de 6 semanas o bien, calendarizando una medicación de una semana con intervalos cada 4 semanas.

- Este manejo nos ayudara a controlar problemas de cistitis-pielonefritis, cuadros neumónicos, infecciones septicémicas.

CERDAS LACTANTES

- Bajar la presión de infección en cerdas lactantes estableciendo un programa de medicación por 2 semanas con 2-3kg/Ton.

- Este manejo nos ayudara a controlar problemas asociados a neumonías, metritis post-parto, agalactia por mastitis y para evitar que las cerdas contaminen a sus lechones en la maternidad.

CERDOS DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

- El tratamiento tendrá una duración 14 días a 2-3Kg Fenovet® por tonelada de alimento equivalente a 10 mg/kg de peso. Efectivo para el control de *Streptococcus suis* y *Haemophilus parasuis* (manifestaciones clínicas de índole septicémico, artrítico, nervioso, cuadros neumónicos). Problemas respiratorios por *Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella multocida*, y *Actinobacillus pleuropneumoniae* además de cuadros entéricos por *Lawsonia intracellularis* y *Clostridium perfringens*.

El estrés, el hacinamiento, el movimiento constante de los cerdos así como las situaciones climáticas adversas son factores de riesgo que contribuyen al desarrollo y a la persistencia de las enfermedades.

- Bajar la presión de infección en cerdos de engorda estableciendo un programa de medicación por 2 semanas (2.5-3kg/Ton) con intervalos de 4 semanas.

- Este manejo nos ayudara a controlar problemas neumónicos por *Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella multocida*, y *Actinobacillus pleuropneumoniae*. Además de cuadros entéricos por *Lawsonia intracellularis* y *Clostridium perfringens*.

