


GANAPORK

Reg. SAGARPA: Q-0029-035

ESPIRAMICINA EN PREMEZCLA



AMPLIA DISTRIBUCIÓN EN TEJIDOS
CON UN EFECTO POSTANTIBIOTICO

¡Proporciona un efecto bacteriopausico!



Se concentran en el tejido pulmonar (macrófagos alveolares) y se absorbe rápidamente a través del sistema digestivo.

ABSORCIÓN Y DISTRIBUCIÓN



LABORATORIOS OVEJERO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
19 SUR NO.4524 COL. REFORMA AGUA AZUL
C.P. 72430 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO
TEL: (+52) (222) 2 31 3935
marketing@labovejero.es · www.labovejero.mx

CUADRO DE ESPECTRO DE ACCIÓN DE LA ESPIRAMICINA


COMPLEJO RESPIRATORIO PORCINO (CRP)

Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica, Actinobacillus pleuropneumoniae

GASTROENTERITIS INFECCIOSA

Clostridium perfringens tipo A, E y D

Amplia distribución en tejidos con un efecto postantibiótico



MECANISMO DE ACCIÓN

1

ANTIBACTERIANO CLÁSICO:

Tiempo dosis dependiente, (concentraciones bactericidas)

2

EFFECTO BACTERIOPAUSICO:

Retraso en capacidad de multiplicación de los patógenos

3

EFFECTO SUB-INHIBITORIO:

Capacidad de fijarse a la pared bacteriana y estimula la fagocitosis



GANAPORK ESPIRAMICINA EN PREMEZCLA

Contenido neto: 25 Kg

Fórmula: Cada 100 g contienen:

Espiramicina embonato.....10 g
Cáscara de almendra-avellana c.b.p.100 g

Especies de destino: Porcinos.

Descripción: es un antibiótico de amplia distribución principalmente en tejido hepático y renal. Presenta un efecto post antibiótico, logrando un efecto más prolongado.

Mecanismo de acción: la espiramicina actúa sobre la subunidad 50S del ribosoma bacteriano inhibiendo la síntesis de proteínas. Tiene efectividad contra bacterias Gram positivas: Staphylococcus; así como mycoplasmas, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica y Actinobacillus pleuropneumoniae.

Indicaciones: para el tratamiento de neumonía enzoótica, rinitis atrófica, pleuroneumonía porcina y gastroenteritis infecciosa.

Dosis: 1-5.7 kg/ton de alimento, equivalente de 8 a 20 mg de espiramicina por kg de peso vivo/día durante 14 días. Debido a la forma de administración y a que el consumo de alimento depende de la condición clínica del animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración de antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de alimento.

Vía de administración: oral en el alimento.


Advertencias: no debe utilizarse en caso de insuficiencia renal grave. No debe administrarse junto con antibióticos betalactámicos por ser antagonistas con la espiramicina. Protégase de la luz en un lugar fresco y seco (temperatura inferior a 25°C). Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No usar el producto 9 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.

USO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

GANAPORK ESPIRAMICINA EN PREMEZCLA



LABORATORIOS OVEJERO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
19 SUR NO.4524 COL. REFORMA AGUA AZUL
C.P. 72430 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO
TEL: (+52) (222) 2 31 3935
marketing@labovejero.es · www.labovejero.mx