

BIOVETALGIN

05-651 DRWALEW

INYECTABLE

METAMIZOL SÓDICO

Nos importa la salud animal

Preparación usada para el tratamiento sintomático del dolor, incluidos los cólicos y en dolores espásticos

**PARA
ENFERMEDADES
QUE PRESENTAN
FIEBRE GRAVE**

incluyendo mastitis, síndrome MMA en cerdos, gripe porcina, cólico en caballos y ganado, cuerpos extraños en el esófago (en caballos, ganado y porcinos).

Inflamación de los nervios, tendones, músculos, articulaciones, vaina del tendón, etc.

**PARA
ENFERMEDADES
REUMÁTICAS GRAVES
Y CRÓNICAS**

www.biowet-drwalew.pl




INNOVATIVE ECONOMY
NATIONAL COHESION STRATEGY

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND



Proyecto cofinanciado por la Unión Europea con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional




LABORATORIOS OVEJERO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
19 SUR NO.4524 COL. REFORMA AGUA AZUL
C.P. 72430 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO
TEL: (+52) (222) 2 31 3935
marketing@labovejero.es · www.labovejero.mx

DOSIFICACIÓN

Aplicar cada 8 horas. Equinos: 20-60 ml/animal (20-50 mg/kg peso vivo): Bovinos: 8 ml por cada 100 kg peso vivo (20-40 mg/kg peso vivo): Porcinos: 10-30 ml/animal (15-50 mg/kg peso vivo): Caninos: 1-5 ml/animal (20-50 mg/kg peso vivo).

**SUMINISTRE ÚNICAMENTE
CON RECETA DEL
VETERINARIO.
USE SOLO EN ANIMALES**

*Bovinos, equinos,
porcinos y caninos*



VIA DE ADMINISTRACIÓN: Intravenosa lenta e intramuscular profunda. En condiciones agudas puede administrarse por vía intravenosa lenta, se permite administrar simultáneamente por vía IM e IV, puede retirarse la administración el mismo día.

BIOVETALGIN INYECTABLE

Composición cualitativa y cuantitativa de sustancias activas: Metamizol sódico.

Especies de destino: Bovinos (productores de carne y leche), Equinos, Porcinos y Caninos.

Periodo de suspensión del medicamento: Tejidos comestibles: Ganado: 12 días. Caballos (administración intravenosa): 5 días. Leche: 48 horas.

Contraindicaciones: No para administración subcutánea. No use en animales con enfermedades del sistema hematopoyético.

Reacciones adversas: La inyección intravenosa rápida puede provocar un shock. Se puede presentar agranulocitosis si se usa a largo plazo. Si después de administrar el medicamento se presenta alguna de las reacciones adversas antes mencionadas o si se observa cualquier otro efecto alarmante no mencionado en este folleto (incluidos los síntomas en humanos después de haber estado en contacto con el medicamento), debe informar al veterinario, al propietario de la autorización comercial o a la oficina encargada de la inscripción de productos medicinales, dispositivos médicos y biocidas.

Precaución(es) especial(es) para la Conservación: Mantenga fuera del alcance y la vista de los niños. Conserve a temperaturas inferiores a los 25°C. Proteja de la luz. Una vez abierto el

frasco, debe usarse dentro de los próximos 28 días. No usar después de la fecha de vencimiento indicada en la etiqueta.

Advertencia(s) especial(es): Los barbitúricos y la glutetimida estimulan la eliminación de metamizol: la administración concomitante de clorpromazina puede provocar hipotermia. No se han registrado signos observables de sobredosis.

Advertencias y precauciones especiales, en caso de existir: Los barbitúricos y la glutetimida estimulan la eliminación de metamizol: la administración concomitante de clorpromazina puede provocar hipotermia. No se han registrado signos observables de sobredosis.

Precauciones especiales para desechar el producto que no se usó o materiales residuales, si los hubiera: Los medicamentos no se deben desechar por el drenaje ni en la basura del hogar. Pregunte a su veterinario cirujano cómo desechar los medicamentos que ya no requiere. Estas medidas ayudan a proteger el medioambiente.


Otra información: Para cualquier información sobre este medicamento veterinario, comuníquese con el propietario de la autorización comercial.

Presentación: 500 mg/ml

**SUMINISTRE ÚNICAMENTE CON RECETA DEL VETERINARIO.
USE SOLO EN ANIMALES.**



**BIOVETALGIN
INYECTABLE**



LABORATORIOS OVEJERO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
19 SUR NO.4524 COL. REFORMA AGUA AZUL
C.P. 72430 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO
TEL: (+52) (222) 2 31 3935
marketing@labovejero.es · www.labovejero.mx