

# MASTIVAC

Reg. SAGARPA.: B-0029-001

Bacterina para la prevención de la mastitis  
del ganado bovino.



Sin tiempo de retiro

Previene la mastitis y reduce el uso de antibióticos

**sanfer®**

# MASTIVAC

Bacterina para la prevención de la mastitis del ganado bovino.

**MASTIVAC** activa las defensas inmunitarias específicas de vacas y novillas, previniendo las infecciones intramamarias, reduciendo las mastitis clínicas y subclínicas y disminuyendo la gravedad de estas.

Constituye una herramienta útil, segura y eficaz, la profilaxis inmunológica, ideal para complementar los programas de control de calidad de leche.

**MASTIVAC** presenta en su composición la mayoría de los gérmenes frecuentemente implicados en la presentación de mastitis bovina, (*Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus pyogenes* y *Corynebacterium pyogenes*), con lo que su aplicación mejora el status inmunitario.

## FÓRMULA

Cada mL contiene cultivos inactivados de:

*Staphylococcus aureus*..... $\geq 12 \times 10^8$  UFC  
*Streptococcus agalactiae* ..... $\geq 9 \times 10^8$  UFC  
*Streptococcus dysgalactiae*..... $\geq 3 \times 10^8$  UFC  
*Streptococcus uberis* ..... $\geq 3 \times 10^8$  UFC  
*Streptococcus pyogenes*..... $\geq 3 \times 10^8$  UFC  
*Escherichia coli*..... $\geq 18 \times 10^8$  UFC  
*Corynebacterium pyogenes*..... $\geq 12 \times 10^8$  UFC

Adyuvante 20% del volumen final

Diluyente: Agua de calidad inyectable

## PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL.

## INDICACIONES

Prevención de la mastitis bovina.

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar dos inyecciones de 5 mL cada una con un intervalo de 15 días entre cada inyección.

**Primovacunación:** Dos meses antes del parto.

**Revacunación:** Anual.



**sanfer®**

USO VETERINARIO. • CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. • PARA USO DEL MÉDICO VETERINARIO. • 10VL0704